

# Checkliste: Indikationsstellung zur Therapie des mittelschweren bis schweren chronischen Handekzems

Gemäß der gültigen AWMF-Leitlinie besteht beim mittel- bis schweren chronischen Handekzem (CHE) nach sorgfältiger Diagnostik und Abklärung der Kausalfaktoren die Indikation für eine Arzneimitteltherapie und/oder Phototherapie. Für die Einleitung oder Fortführung der Therapie mit topischen Arzneimittel-Innovationen und mit zugelassenen Systemtherapeutika sind die folgenden Kriterien zu prüfen:

1. Allgemeine Voraussetzungen für die Therapie			Ja
1	Alter	≥ 12 Jahre (Zulassungsstatus beachten)	<input type="radio"/>
2	Diagnose	Klinisch gesichertes chronisches Handekzem inklusive Abklärung von Kausalfaktoren	<input type="radio"/>

2. Klinische Eignungskriterien für die Therapie des mittel- bis schweren CHE			Ja
<b>A</b>	<b>Relevanter objektiver Schweregrad</b>	<p>Liegt vor, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien bei Baseline (vor erster Therapie) gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Globaler Schweregrad</b> (IGA oder PGA)* mind. 3 auf einer 5-teiligen Skala <u>oder</u></li> <li>• <b>HECSI*</b> mind. 17 (von 360) <u>oder</u></li> <li>• Relevante <b>berufliche Einschränkungen</b> / Abwesenheit vom Arbeitsplatz</li> </ul>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>B</b>	<b>Relevante subjektive Belastung</b>	<p>Liegt vor, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien der <u>krankheitsbezogenen</u> Belastung gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DLQI &gt;10 oder cDLQI &gt;10</b> (von 30) <u>oder</u></li> <li>• <b>QOLHEQ* &gt;59</b> (von 129) <u>oder</u></li> <li>• <b>NRS* Pruritus &gt;6</b> (auf VAS oder NRS von 0-10) <u>oder</u></li> <li>• Relevante krankheitsbedingte psychosoziale oder funktionelle Beeinträchtigung, gemessen mit einem standardisierten Messverfahren, z.B. WHO-5: .....</li> </ul>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>C</b>	<b>Fehlendes Therapie-Ansprechen</b>	<p><b>Andere Maßnahmen</b> (topische Glukokortikosteroide (TCS) <u>und/oder</u> topische Calcineurininhibitoren (TCI; bei L20.8) <u>und/oder</u> Phototherapie) kommen nicht in Frage, da <u>mindestens eines</u> der nachfolgenden Kriterien gegeben ist:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein hinreichendes Ansprechen / Kontraindikation einer Phototherapie und einer Lokalthherapie (TCS, TCI) <u>oder</u></li> <li>• Keine Aussicht auf Erfolg mit TCS, TCI und Phototherapie</li> </ul>	<input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>D</b>	<b>Prävention</b>	<b>Hautschutz-Maßnahmen</b> oder weitere indizierte Maßnahmen der Sekundär- und Tertiärprävention haben nicht zu einer hinreichenden Besserung geführt	<input type="radio"/>

3. Schlussfolgerungen	
<b>E</b>	<p>➔ Die Indikation für die Therapie ist gegeben, da für A, B, C und D <u>jeweils mindestens ein Kriterium</u> zutrifft: <span style="float: right;"><input type="radio"/> Ja</span></p>
<b>F</b>	<p>➔ Folgende zugelassene Therapeutika sind wegen bereits aufgetretener Nebenwirkungen, Kontraindikationen oder fehlender Nutzenerwartung <u>nicht</u> indiziert:</p> <p>_____</p>
<b>G</b>	<p>➔ Therapieeinleitung mit: _____</p>
<b>H</b>	<p>➔ <b>Optional: Einverständnis des Patienten (Eltern) nach Aufklärung liegt vor:</b> <span style="float: right;"><input type="radio"/> Ja</span></p> <p>_____</p> <p>(Ggf. Datum, Unterschrift)</p>

\* IGA= Investigator Global Assessment; PGA=Physician Global Assessment; HECSI= Hand Eczema Severity index; \*QOLHEQ=Quality of Life in Hand Eczema Questionnaire; NRS= Numerische Rating Skala (Bezug: letzte 24h, 3 Tage oder 7 Tage)